


Handbooks du CIRC Volume 19 : Prévention du cancer de la cavité buccale

Estimation de l'incidence standardisée sur l'âge (dans le Monde) en 2020, des cancers des lèvres et de la cavité buccale, pour les deux sexes



Prévention primaire – Impact de l'arrêt de l'exposition au facteur de risque de cancer de la cavité buccale

Tabagisme	Tabac non fumé	Noix d'arec (incluant chique de bétel) avec ou sans tabac	Consommation d'alcool
Suffisantes	Insuffisantes	Suffisantes	Suffisantes
Le risque élevé du au tabagisme diminue avec le temps écoulé depuis l'arrêt du tabagisme. Les études suggèrent que le risque de leucoplasie diminue également après l'arrêt du tabagisme.	Le Groupe de travail a noté la rareté des études, en particulier l'absence d'études provenant des pays avec la plus grande utilisation de tabac non fumé, et d'études sur les produits avec du tabac non fumé autres que le tabac à priser humide.	En plus du risque de cancer de la cavité buccale, le risque élevé de troubles buccaux potentiellement malins (TBPMs) dus à l'utilisation de produits à base de noix d'arec (incluant la chique de bétel) avec ou sans tabac diminue également après l'arrêt.	Le risque élevé du à la consommation d'alcool diminue avec le temps écoulé depuis l'arrêt de la consommation d'alcool. La réduction du risque devient plus visible 10 ans après l'arrêt et est plus grande chez les gros buveurs (≥ 3 verres par jour).

Prévention secondaire – Efficacité du dépistage du cancer de la cavité buccale



Groupe B

Le dépistage des individus à haut risque par un examen clinique buccal pourrait réduire la mortalité par cancer de la cavité buccale. Les individus à haut risque sont définis par les utilisateurs de tabac, noix d'arec ou alcool ou d'une combinaison de ces produits, sous quelque forme que ce soit.

Prévention primaire – Impact des interventions pour l'arrêt des produits contenant du tabac non fumé ou de la noix d'arec

Intervention comportementale - adultes	Intervention comportementale - jeunes	Intervention pharmacologique	Intervention combinée
Suffisantes	Limitées	Limitées	Limitées
L'évaluation s'applique à l'arrêt de l'utilisation de tabac non fumé.	L'évaluation s'applique à l'arrêt de l'utilisation de tabac non fumé.	L'évaluation s'applique aux interventions avec des substituts nicotiques ou des antidépresseurs pour arrêter l'utilisation de tabac non fumé et de produits à base de noix d'arec avec du tabac.	L'évaluation s'applique à l'arrêt de l'utilisation de tabac non fumé.